

Síntomas Biomecánicos y Síntomas Neurológicos Post-Polio

Una "Mesa redonda sobre los **Efectos Tardíos de la Polio / Síndrome Postpolio**" tuvo lugar en la ciudad de Melbourne, el 30 de Marzo de 2012, ante los Comités de la Cámara de Representantes del Parlamento de Australia¹. Durante la discusión, el consenso entre los participantes fue que los **Efectos Tardíos de la Polio (ETP)** son "una serie de síntomas predominantemente **biomecánicos**, mientras que el **Síndrome Post-Polio (SPP)** se caracteriza por una serie de síntomas **neurológicos**". En términos generales, los participantes consideraron que el **SPP** es una **subcategoría** de los **ETP**, y la manifestación más grave de las secuelas post-polio. De hecho, en el capítulo 2 de la información presentada en la mencionada mesa redonda se explica que:

*Efectos Tardíos de la Poliomiелitis (ETP) es un término diagnóstico amplio, que abarca la gran variedad de síntomas que una persona con una historia de poliomiелitis puede experimentar. Esto puede incluir síntomas que pueden atribuirse directamente a los daños causados por el episodio de poliomiелitis aguda, como debilidad residual, desequilibrio musculo-esquelético, retraso del crecimiento, deformidades esqueléticas, insuficiencia respiratoria o intolerancia al frío... Otra **subcategoría** de los **ETP** es el **Síndrome Post-Polio (SPP)**. El **SPP** es una combinación variable de una nueva debilidad muscular progresiva y otros síntomas en los sobrevivientes de la poliomiелitis paralítica, que aparece generalmente al menos 15 años después de la enfermedad aguda... El síntoma cardinal del **SPP** es una nueva debilidad muscular o fatiga muscular que empeora gradualmente.²*

Esta es la postura de diversos autores³ y también la que expresa el interesante manual titulado "**The Late Effects of Polio; Introduction to Clinical Practice**", publicado en ese mismo año por "Polio Australia Incorporated", donde se puede leer que:

*El **Síndrome Post-Polio** es generalmente considerado una **sub-categoría** de los **Efectos Tardíos de la Polio**, y se considera un trastorno **neurológico** caracterizado por una mayor debilidad y / o fatiga muscular anormal, que ocurre muchos años después de la infección inicial de la poliomiелitis.⁴*

1. Cf. House of Representatives Committees. Roundtable on Late Effects of Polio/Post-Polio Syndrome. Parliament of Australia. Melbourne, Australia. 30 March 2012. President: Steve Georganas MP. Vicepresident: Steve Irons MP.
2. [Chapter 2 Issues and conclusions](#) [consultado el 26 June 2014].
3. Vsitrain, Sergio Augusto. [Patologías y síntomas tardíos en personas afectadas por la poliomiелitis](#). OMCETPAC. 2013 Junio; 7.
4. Polio Australia Incorporated . The Late Effects of Polio - Introduction to Clinical Practice. Polio Australia Incorporated 2012, p.1

