

Los **“Efectos tardíos de la polio”** son los **muchos síntomas nuevos** que los pacientes con una historia de poliomielitis pueden experimentar y que pueden implicar una nueva disfunción de la unidad motora, o resultar de condiciones médicas secundarias, relacionadas con los efectos residuales de la poliomielitis.

Nollet F. Post-Polio Syndrome. Orphanet Encyclopedia.  
January 2003. Update: March, 2004.


En otras palabras, los **“Efectos tardíos de la polio”** no son una sola y única enfermedad; son muchas aristas de un mismo bloque de patologías que guardan relación con el hecho de haber padecido la poliomielitis y haber vivido durante muchos años con sus secuelas.

Cada una de dichas patologías tiene asignado, en la **Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10)**, un código específico que la identifica y la diferencia claramente de las demás.

A manera de ejemplo, se presentan aquí sólo algunas de esas múltiples patologías, así como sus respectivos códigos en la **CIE-10**.



Efectos tardíos de la polio (ejemplos)*	
Patología	Código
Episodio depresivo	F32
Atrofia muscular espinal	G12.9
<b>Síndrome Postpolio</b>	<b>G14</b>
Trastornos del sueño	G47
Apnea del sueño	G47.3
Compresión de la raíz nerviosa y el plexo, en trastornos del disco intervertebral	G55.1
Síndrome del túnel carpiano	G56.0
Lesión del nervio cubital	G56.2
Lesión del nervio ciático	G57.0
Poliartrosis	M15
Gonartrosis	M17.9
Artralgia (Dolor en articulaciones)	M25.5
Otras escoliosis secundarias	M41.5
Trastornos del disco intervertebral lumbar y otros con radiculopatía	M51.1
Radiculopatía	M54.1
Ciática	M54.3
Dolor de espalda baja	M54.5
Trastornos de tejidos relacionados con el uso, el uso excesivo y la presión (bursitis, tendinitis)	M70
Síndrome del manguito rotador	M75.1
Mialgia (dolor muscular)	M79.1
Osteoporosis por desuso	M81.2



\* Fuente: [Vistrain. Patologías y síntomas tardíos en personas afectadas por la poliomielitis. OMCETPAC. 2013 Junio; 7](#)