


# Efectos Tardíos de la Polio y Síndrome Postpolio

## NO SON LO MISMO.



*Los tres términos principales de diagnóstico –efectos tardíos de la polio, síndrome postpolio y atrofia muscular postpolio–, pueden ser descritos imaginando tres círculos concéntricos. Un gran círculo exterior con la etiqueta “efectos tardíos de la polio”. En el interior del gran círculo imaginemos un círculo más pequeño con la etiqueta “síndrome postpolio”. El círculo más pequeño y más interior corresponde a la atrofia muscular postpolio.*

Halstead, 1994

*“Efectos tardíos de la polio” y “Secuelas tardías de la polio” son los muchos síntomas nuevos que los pacientes con una historia de poliomiелitis pueden experimentar y que pueden implicar una nueva disfunción de la unidad motora [SPP], o resultar de condiciones médicas secundarias, relacionadas con los efectos residuales de la poliomiелitis.*

Nollet, 2004

*El término “Efectos tardíos de la poliomiелitis” se refiere principalmente a aquellas condiciones que los pacientes [que padecieron la poliomiелitis] pueden presentar. Estos están divididos en tres tipos de categorías:*

- a) Síntomas que pueden ser atribuidos directamente al daño causado por los poliovirus tales como: parálisis residual, desequilibrio músculo-esquelético, retardo del crecimiento, deformidades esqueléticas que afectan los miembros, insuficiencia respiratoria e intolerancia al frío debido a trastornos circulatorios;*
- b) Síntomas que resultan de la incapacidad del cuerpo para permanecer indefinidamente en el período de estabilidad funcional, con el inicio de una nueva debilidad y fatiga - el síndrome postpolio;*
- c) Síntomas resultantes de trauma secundario incluyendo neuropatía compresiva, artritis degenerativa, dolores articulares, tendinitis y bursitis.*

Oliveira & Quadros, 2008