




Discapacidad - diferencias entre hombres y mujeres.

Sergio Augusto Vistrain

La “Enfermedad” es la causa más frecuente de las limitaciones para “caminar o moverse”, así como para “ver” y para “atender el cuidado personal; principalmente entre las mujeres”.

Tipos de limitaciones en la actividad							
Porcentaje de limitaciones	Ver*	Escuchar*	Atender el cuidado personal*	Moverse*	Comunicarse*	Trabajar*	Transporte*
Causas de las limitaciones: Enfermedad							
Hombres	7.4	11.4	13.5	54.6	19.5	54.5	51.2
Mujeres	5.9	10.5	11.4	53.4	13.6	40.7	52.3
Causas de las limitaciones: Fracturas							
Hombres	40.4	40.5	23.2	24.3	39.2	21.0	22.4
Mujeres	44.9	43.7	27.1	26.5	42.3	22.8	24.8
Causas de las limitaciones: Accidentes							
Hombres	23.4	11.5	11.2	7.1	20.0	6.4	4.5
Mujeres	18.5	8.5	4.5	4.6	10.2	3.7	4.3
Causas de las limitaciones: Otras discapacidades							
Hombres	22.2	23.7	42.9	9.4	16.2	11.1	2.4
Mujeres	28.2	28.0	46.4	9.6	28.8	21.7	6.6



Discapacidad - diferencias entre hombres y mujeres.

Con base en el Censo de Población y Vivienda, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) en el año 2010, ese mismo instituto, en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), realizó un análisis especial a partir de información estadística, cuyo objetivo específico fue el de mostrar el panorama de la situación actual de las mujeres, en relación con la de los hombres, en diferentes esferas de la vida. Esto con la intención de identificar los principales aspectos donde se observan las principales desigualdades. Ese análisis fue publicado en el trabajo titulado “Mujeres y hombres en México 2011”¹.

Como en dicho censo se registraron las “limitaciones en la actividad cotidiana” (discapacidades) de las personas, el trabajo referido dedica un apartado precisamente a las desigualdades encontradas entre hombres y mujeres, específicamente, en la “Población con Discapacidad”. Ese apartado, vale la pena destacarlo, muestra algunas comparaciones entre ambos sexos, considerando el grupo de edad al que pertenecen estas personas, la entidad y el tamaño de la localidad donde viven, su situación conyugal, los servicios de salud a que tienen acceso, analfabetismo, escolaridad, características económicas, empleo y, por supuesto el tipo de limitaciones que les afecta, así como sus causas, al igual que todas las comparaciones que se reportan resultan bastante interesantes para toda persona interesada en esta temática.

Por lo que respecta a la Organización Mexicana para el Conocimiento de los Efectos Tardíos de la Polio, Asociación Civil (OMCETPAC), nuestro interés se centra específicamente en lo que tiene que ver directamente con las limitaciones; sus tipos y sus causas, por lo que, lejos de pretender replicar ese estupendo trabajo, solamente queremos llamar la atención sobre ese punto muy en concreto.

Así, en la gráfica 1 puede observarse que la limitación más frecuente se refiere a “caminar o moverse”, mientras que, en la gráfica 2, queda claro que la “Enfermedad” es la principal causa de las limitaciones, y que ésta es aún más frecuente entre las mujeres.

Por otro lado, en la gráfica 3 se observa claramente que siendo la “Enfermedad” la principal causa de las limitaciones, en general, también lo es específicamente para “Caminar o moverse”, así como para “Ver” y para “Atender el cuidado personal”, mientras que para “Oír”, la principal causa es la “Edad avanzada”. Por lo que respecta a las otras limitaciones (“Hablar o comunicarse”, “Poner atención o aprender” y “Mental”) la causa es más bien congénita (nacimiento).

Y, al desglosar esta información por hombres y mujeres, en el cuadro 1 se hace evidente que, entre los hombres, las causas más frecuentes de sus limitaciones son el nacimiento y los accidentes, mientras que, entre las mujeres, son más frecuentes las enfermedades y la edad avanzada las causas más frecuentes.

Concretamente, las enfermedades, que son nuestro centro de interés, son la causa de las limitaciones, más frecuentemente entre las mujeres, que entre los hombres. Y de las

limitaciones para “Caminar o moverse”, que constituyen la consecuencia más común, tanto de la poliomielitis, como del síndrome postpolio y otros efectos tardíos de la enfermedad, la causa es, en primer lugar, la enfermedad y, en segundo lugar, la edad.

Gráfica 1. Distribución del tipo de limitación (entre las personas que padecen alguna)



¹ Incluye a las personas que aun con anteojos tenían dificultad para ver.


² Incluye a las personas que aun con aparato auditivo tenían dificultad para oír.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Base de datos de la muestra.

Gráfica 2. Causa de la limitación, según sexo



Gráfica 3. Tipo de limitación según causas



Cuadro 1. Tipo de limitación y causa, según sexo.

	Tipo de limitación en la actividad						
	Caminar o moverse	Ver ¹	Oír ²	Hablar o comunicarse	Atender el cuidado personal	Poner atención o aprender	Mental
Causa de la limitación: Nacimiento							
Hombres	↑ 7.8	↑ 11.4	↑ 13.5	↑ 56.6	↑ 19.5	↑ 50.5	↑ 53.2
Mujeres	↓ 5.9	↓ 10.5	↓ 13.4	↓ 53.4	↓ 13.6	↓ 40.7	↓ 52.3
Causa de la limitación: Enfermedad							
Hombres	↓ 40.4	↓ 40.3	↓ 23.2	↓ 24.3	↓ 39.2	↓ 21.0	↓ 22.4
Mujeres	↑ 44.9	↑ 43.7	↑ 27.1	↑ 26.5	↑ 42.3	↑ 22.8	↑ 24.8
Causa de la limitación: Accidente							
Hombres	↑ 23.8	↑ 11.1	↑ 11.2	↑ 7.1	↑ 20.0	↑ 6.4	↑ 8.5
Mujeres	↓ 14.5	↓ 3.5	↓ 6.5	↓ 4.6	↓ 10.3	↓ 3.7	↓ 4.3
Causa de la limitación: Edad avanzada							
Hombres	↓ 22.2	↓ 23.7	↓ 42.9	↓ 5.4	↓ 16.2	↓ 11.1	↓ 2.8
Mujeres	↑ 28.2	↑ 28.0	↑ 46.4	↑ 9.6	↑ 28.6	↑ 21.7	↑ 6.6

1 Incluye a las personas que aun con anteojos tenían dificultad para ver.
2 Incluye a las personas que aun con aparato auditivo tenían dificultad para oír.
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Base de datos de la muestra.

Finalmente, por lo que respecta a las limitaciones para “Atender el cuidado personal”, que suelen ser también consecuencia, tanto de la poliomielitis, como de sus efectos

tardíos, y las cuales tienen también como principal causa la enfermedad, ésta es también más frecuente entre las mujeres, que entre los hombres.

Desde luego, sería para nosotros mucho más valioso e ilustrativo conocer específicamente las cifras referentes a la enfermedad que nos atañe; la poliomielitis y sus efectos tardíos. No obstante, esta información nos resulta muy interesante.

Referencia:

¹ Mujeres y hombres en México 2011. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Nacional de las Mujeres. México : INEGI, c2012.
